

Treść instrukcji stosowania i przechowywania stymulatora wzrostu pn. „WSPOMAG”

Zakres stosowania:

Stymulator wzrostu WSPOMAG można stosować w uprawie roślin ozdobnych ale też w parkach i terenach miejskich, na działkach i w ogrodach przydomowych, a także w produkcji roślin pod osłonami.

Środek wspomagający uprawę roślin może być również stosowany do opryskiwania, podlewania i moczenia nasion, cebul, bulwo-cebul, bulw, karp, kłaczy, itp.

Środek można stosować w szkółkach roślin ozdobnych, w uprawach kwiatów ozdobnych i doniczkowych, plantacjach kwiatów w gruncie.

Dawka, sposób i termin stosowania:

a/ opryskiwać 2 - 3-krotnie co 7 - 10 dni, po wystąpieniu pierwszych objawów zahamowania wzrostu i żółknięcia liści.

b/ podlewać 1-2 l cieczy roboczej/m² bezpośrednio po sadzeniu lub 2 lub 3-krotnie punktowo na całą roślinę tak, aby roztwór dostał się najbliżej korzeni w promieniu 50 cm od miejsca wystąpienia objawów.

- W przypadku wystąpienia zmian w wyglądzie roślin i ich wzroście, zaleca się stężenie 25%. Rośliny powinny być dokładnie pokryte cieczą roboczą, a jej ilość zależna jest od ich wielkości.
- Podlewanie punktowe zalecane w promieniu 20 cm od miejsca wzrostu rośliny.
- Skuteczność środka widoczna jest już przy poziomie stosowania roztworu w stężeniu 4-10%.
- Stosowany poziom stężenia stymulatora wzrostu zależy od stanu kondycyjnego roślin, ich wielkości - czyli fazy rozwojowej.

UWAGA: Należy skoncentrować strumień roztworu tak, by kierował ciecz wprost na rośliny. Zabiegi najlepiej wykonywać pod wieczór, przed opadaniem rosy.

Sposób sporządzania cieczy:

a/ 25 % zawiesina do moczenia - zaprawa np.: do nasion, bulw, cebul i kłaczy - przez 45 minut (5 l preparatu na 15 l wody);

b/ 10 % zawiesina do opryskiwania (10 l preparatu + 90 l wody);

c/ 4 % zawiesina do podlewania (4 l preparatu + 96 l wody).

Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze uniemożliwiającej zamarznięcie tj. od +4 do +18 stopni.

Środki ostrożności:

Zabezpieczyć przed przypadkowym spożyciem.

Podczas stosowania zachować podstawowe środki ostrożności.

W przypadku dostania się środka do oczu przemyć je czystą wodą.

Używać odzież ochronną, a po wykonaniu wszelkich czynności umyć ręce.

Nie stosować na pastwiskach.